

UVOD

Iako su reumatoidni artritis kao i druge muskuloskeletalne bolesti bili poznati od davnina tek poslednjih 25 godina naučnici, lekari i društvo u celini, posvećuje veću pažnju ovim bolestima shvatajući njihov značaj s medicinskog, socijalnog i ekonomskog aspekta. Zbog toga je Svetska zdravstvena organizacija (WHO) proglašila prošlu deceniju "Deceniju kostiju i zglobova".

Danas u Evropi boluje više od 300 miliona ljudi od reumatskih bolesti. Stoga je prošle godine parlament Evropske unije doneo Deklaraciju o reumatskim bolestima kojom se utvrđuju smernice u borbi protiv ovih bolesti, i definisu ih kao "glavne bolesti", u koje spadaju karcinomi, kardiovaskularne bolesti, šećerna bolest itd.

Najviše zasluga za to, osim spomenutih činjenica, nosi i vodeća organizacija za borbu protiv reumatizma EULAR (European League Against Rheumatism), - Evropska liga protiv reumatizma. Od 1992. godine.

REUMATOIDNI ARTRITIS

Od reumatoidnog artritisa boluje 1-2% ljudi i u 75% zahvata žene. Najčešći je između 35. i 65. godine života ali se može javiti i u bilo koje drugo doba života. Oblik artritisa koji se javlja kod dece do 16-te godine života, poznat kao juvenilni idopatski artritis, može početi već u prvoj godini života.

Sl.1. Slika natečenog prsta devojčice od 2,5 godine

Postoji više od 200 različitih tipova artritisa i za većinu uzrok bolesti nije poznat. Naime, smatra se da reumatoidni artritis može nastati kod genetski predisponiranih osoba s poremećajem imunog odgovora na različite činioce (prvenstveno mikroorganizme) okoline.

Definicija RA

Reumatoidni artritis je upalna reumatska bolest koja zahvata najčešće male zglobove šaka i stopala i širi se prema ostalim zglobovima. Izaziva bol, natečenost zglobova, jutarnju ukočenost, ograničenu i bolnu pokretljivost i vodi ka nesposobnosti za obavljanje svih aktivnosti. Time ova bolest bitno umanjuje kvalitetu života. U težim slučajevima bolest može zahvatiti i druge organe: pluća, bubrege, srce, oči i krvne sudove. Ako se ne liječi bolest sigurno i neizostavno napreduje.

Klinička slika

Klinička slika bolesnika s reumatoidnim artritisom se razlikuje od bolesnika do bolesnika i menja se tokom bolesti kod pojedinih bolesnika. Najčešći početak bolesti (u 55%-70% bolesnika) je neprimetan, a znaci bolesti se javljaju tokom nekoliko nedelja ili meseci. Uz bolove u zglobovima obično postoje i opšti simptomi (katkada i pre bolova u zglobovima) kao što su umor, slabost, blago povišena telesna temperatura, gubitak telesne težine te nespecifične mišićno-koštane tegobe u vidu nejasnih bolova. Ponekad i pre otekline i bolova u zglobovima javlja se i jutarnja ukočenost u zglobovima.

----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. -----

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com