

## Oboljenja ženskih polnih organa i dojke

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije

### Patologija ženskih polnih organa

U unutrašnje polne organe ubrajaju se jajnici (ovaria), jajovodi (tuba), materica (uterus) i usmina ili rodnica (vagina). U spoljašnje polne organe žene ili vulva, ubrajaju se velike i male usne (labia maiora pudendi i labia minora pudendi), dražica (clitoris), tremna glavica (bulbus vestibuli) i velike tremne žlezde (glandulae vestibulare maiores).

### Patologija jajnika i jajovoda

Zapaljenje jajnika (oophoritis) može biti jednostrano ili obostrano. najčešći izazivači zapaljenja jajnika su gonokoke, a mogu da budu i piogene bakterije kao što su stafilokok i streptokok, a takođe bakterije mogu dospeti do ovarijuma i putem krvi.

Zapaljenje jajnika delimo na :

Pluralne odnosno gnojne,

Tuberkulozne,

Seriozna zapaljenja.

1

Pluralna ili gnojna zapaljenja pored edema u tkivu jajnika postoje manje ili veće šupljine ispunjene gnojnim sadržajem (apsces).

Apscesi mogu da izazovu uvećanje jednog ili oba jajnika. Uspešno lečenje ovakvih zapaljenja dolazi tek onda kada se stiša upala i kada pređe u hronično oboljenje. Posledice ovakve upale jajnika su stvaranje sraslina oko jajnika i po površinama drugih organa.

Promene tuberkuloznog ooforitisa sastoje se u stvaranju čvorića i čvorova karakterističnog za tuberkulozna zapaljenja. Obično nastaju širenjem infekcije iz tuberkulozno zapaljenog jajovoda ili peritoneuma.

Seriozni oofaritis obično zahvata oba jajnika pa se pored edema i hiperemije u njihovom tkivu nalaze granulociti. Ovo zapaljenje je kratkog tipa može da prethodi gnojnom zapaljenju jajnika.

Jajnik, jajovod i materica (snimak pomoću kamere - sonde)

Zapaljenje jajovoda

Najčešće zapaljenja jajovoda izazivaju bakterije i to su: gonokoke, stafilokoke, streptokoke, bacil turbekoloze i druge, a sve one dospevaju do jajovoda preko materice, a zatim sa peritoneuma hematogenim ili limfnim putem.

Nakon nekoliko dana posle pojave ovakvih zapaljenja jajovoda postaju gnojna i ispunjena potpuno ili delimično lumen jajovoda. Gnojna zapaljenja ređe se završavaju trajnim izlečenjem već samo zalečenjem jer se konstantno vraćaju a obično prelaze u supkutani ili hronični tok zapaljenje jajovoda.

2

### MARIJA

Beningni tumori

Beningni tumori se često javljaju. Ovi tumori ne čine neke naročite smetnje sem onda kada svojim obimom i težinom vrše pritisak na druge organe trbušne duplje. Beningni tumori se još nazivaju i dobroćudnim tumorima jer mogu da se uklone perativno. Razvijaju se od mišićnog dela zida materice (myometrijum) pa se nazivaju leiomiomi (miomi).

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE  
PREUZETI NA SAJTU. -----**

[www.maturskiradovi.net](http://www.maturskiradovi.net)

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: [maturskiradovi.net@gmail.com](mailto:maturskiradovi.net@gmail.com)