

Edukacija pacijenata o ileostomi

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka strukovna medicinska škola

Храна коју једемо пролази кроз једњак и улази у желудац. Ту ензими и гастрнични сокови из желуца и из танког црева започињу процес варења.

Храна постаје течна и апсорција храњивих материја. Танко цревео је дугачко неких 6-7 метара. У дебелом цреву и ректуму преостала течност соли и витамини се апсорбују. Несварена храна због тога добија чвршћу конзистенцију када напуста дебело црево па се тада назива fecesom или стомицом.

Желудац, танко и дебело црево се налазе у абдоминалној шупљини. Дебело црево почиње у доњем десном делу абдомена. Одатле креће десном страном абдомена, прелази налево где се левом страном спушта до краја на ректуму. Илеостома служи да избаци измет из танког црева кроз отвор на stomaku. После операције измет се не избацује кроз ректум то се остварује преко илеостоме, отвора на stomaku. Са илеостомом је могуће водити нормалан живот.

ОПЕРАЦИЈА

Када је танко црево оболело, операција може бити потребна. Понекад је потребно одстранити и дебело црево и ректум. У том случају танко црево је спроведено до отвора на stomaku и пришивено на stomak. Медицинском терминологијом то се назива илеостома, илеум што значи танко црево и stomak, што значи отвор или уста.

Настава када се здрави део танког црева изведе на површину stomaka где се фиксира и на тај начин формира отвор за елиминисање садржаја. Илеостома може бити привремена и трајна, а садржај који се из ње излучује је течан, обилан и по својој природи прилично агресиван. Због тога се нези илеостоме мора посветити посебна пажња.

Положај илеостоме

Илеостома се обично изводи на левој страни stomaka, мало испод пупка.

Изглед илеостоме

Илеостома је црвена и има готово исту боју као слузокожа у устима обично је округла понека може бити мало издужена. Одмах после операције stomija је отекла, касније постаје мања. Њена нормална величина је 2 до 4 cm у ширини а дужина 3 до 4 cm.

Веома је важно да разумете разлоге због којих је потребно извести stomiju и све оно што тај хируршки захват доноси. Забринутост која прати операцију и промену која на тај начин настаје сасвим је природна. Stomiju треба прихватити и привикнути се на другачији начин елиминисања продуката варења из организма. Пре свега важно је знати да је извођење привремене или трајне stomije операција за коју се хирурзи одлучују само у ситуацији када је то неопходно за оздрављење

----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. -----

www.maturskiradovi.net

МОŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com