

SADRŽAJ

1. O alkoholizmu.....	3
2. Alkoholizam(1).....	5
3. Alkoholizam(2).....	10
4. Alkoholizam(3).....	13
5. Alkohol.....	17
6. Alkohol(1).....	27
7. Anonimni alkoholičari.....	31
8. Alkohol i žene.....	32
9. Specifičnost alkoholizma kod žena.....	35
10. Trovanje alkoholom ili intoksikacija.....	36
11. Odvikavanje od alkohola.....	36
12. Alkoholizam izjeda srbiju.....	43
13. Literatura.....	49

O alkoholizmu

Definicija alkoholičara Svetske zdravstvene organizacije glasi:

Zavisnost može biti i kombinovana, psihička i fizička. Obično se prvo javlja psihička zavisnost koja kasnije prelazi u fizičku.

Razvoj alkoholizma, to jest zavisnosti od alkohola ima određeni tok:

Alkoholizam u prvoj fazi

Prva faza društvene upotrebe označava privikavanje na alkohol. Što se više pije, više raste podnošljivost prema alkoholu (tolerancija) koja je različita u zavisnosti od pojedinca. Usled porasta tolerancije da bi se postigao isti efekat potrebno je sve više i više pića.

Alkoholizam u drugoj fazi

Druga faza alkoholizma započinje prestankom rasta tolerancije, a označena je alkoholnim zaboravom.

Dolazi do zavisnosti od alkohola i do različitih znakova društvenih i zdrastvenih oštećenja. Ličnost i ponašanje alkoholičara se menjaju.

Alkoholizam u trećoj fazi

Treća faza je okarakterisana nepovratnim oštećenjima (ireverzibilnih). Započinje padom podnošljivosti alkohola. Alkoholičaru je na kraju dovoljna jedna čaša da se opije. On ima veliki broj alkoholnih oštećenja, smetnji i nesanicu.

"Alkoholičarem se smatra osoba koja duže i prekomerno pije alkoholna pića, kod koje se razvila zavisnost od alkohola i koja pokazuje najčešće poremećaje ponašanja te dolazi do oštećenja duševnog i telesnog zdravlja kao i finansijske situacije. U pojam alkoholičara uključuje se već i onaj ko pokazuje početke poremećaja u tom smislu."

Prema tipu zavisnosti alkoholičari se dele na psihičke i fizičke zavisnike

Psihički zavisnici piju da bi sebi olakšali savladavanje poteškoća. Njihova je osobenost gubitak mogućnosti kontrole nad dalnjim pijenjem. Kad popiju nekoliko pića više ne mogu stati i piju dok se ne napiju.

Fizički zavisnici osećaju metaboličnu žudnju za alkoholom, ne mogu živeti bez pića i stoga piju svakodnevno. Njihova je osobenost gubitak sposobnosti nepijenja.

Simptomi apstinencije (uzdržavanja) su: teskoba, nemir, ubrzani puls, znojenje, drhtanje ruku, mučnine i povraćanja, uzbuđenost, nesanica, napadi, padavice, prolazne dodirne, slušne i vidne halucinacije.

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. -----**

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com