

Bolesti na tutunot (makedonski)

Vrsta: Seminarski ð Broj strana: 24 ð Nivo: Zemjodelski fakultet, Skopje

Plamenica na tutunot

(Peronospora tabacina Adam)

Plamenicata na tutunot pretstavuva edna od najcesteite i najopasnite gabni bolesti na tutunskata kultura kaj nas i vo svetot. Kako što e poznato, parazitot na ovaa bolest vo Evropa e otkrien 1958 godina na tutunskite rastenija što trebalo da služat za ispituvawe na rastitelni virusi vo oranžeriите na naučnite ustanovi vo Rothamsted, Anglija i vo Wageningen, Holandija. Poradi nevnimanie vo raboteweto, ovoj parazit bil prenesen na rasadenite tutunski rastenija na nivoa vo Holandija, ottamu se rasprostranil vo mnogu zemji vo Evropa , Afrika i Azija.

Avstralija se smeta za tatkolina na parazitnata gaba P.tabacina. Vo severniot del na ovoj kontinent, ušte vo 1891 godina bila zabeležana na kulturnite i divite vidovi tutuni. Za kuso vreme bolesta se prošrla i zafatila mošne širok areal, nanesuvajќи му ogromni šteti na tutunoproizvodstvoto, osobeno vo 1934 godina.

Rastenija domaćini - Od golem broj opiti vo Evropa, Avstralija i SAD, e potvrdeno deka gabata P.tabacina e tesno specijaliziran parazit. Najčesto rastenijata domaćini se od rodot Nicotiana, a može da parazitira i nekoi vidovi od familijata Solanaceae.

Simptomi – Parazitot P.tabacina najčesto gi zarazuva listovite na tutunskoto rastenie, na koi pričinuva najkarakteristični simptomi. Ovoj parazit može da se pojavi i na korenot, stebлото, cvetot i semenskите čauri. Negovoto prisustvo može da bide zabeležano vo site fazi od niknuvaweto na semeto, so završuvaweto na berbata na listovite. Ako zarazata nastapi vednaš po niknuvaweto na rasadot vo leite, rastenijata dobivaат žoltenikava boja, zaostanuваат vo rastot i vo povlažni uslovi potpolno uginuваат. Kaj podocnite zarazi vo leite, prvite znaci se manifestiraат со појава на жолтеникави дамки на listovite. Tie poslabo ili posilno se zavitkuваат надолу и на нивната опаčина се појавува karakterističна бела муслива покривка, sostavena od micelijata i organite за razmnožuvawe na parazitot. Овaa, во почетокот е poretna, а подоцна се згуснува. Во повлаžни uslovi, процесот на образувавето на покривката е забрзан, таа е sinkavo oboena, i poradi тоа болеста во Amerika i Avstralija dobila име “Blue mold”, што значи сина муља. So stareeweto na vlaknata stantuva crvenkasta, a ponekogaš se zabeležuva i na gornata strana na listot. Najčesto таа е prisutna na izvitkanite kraиша на listot, a mnogu retko i na lisnite drški. Vo leata obolenite listovi se raspoznavaat tokmu po tipičnoto zavitkuvawe kon опачината на listot. -----

OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. -----

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com