

SADRŽAJ:

- 1.0 Porođajne povrede
 - 1.1 Povrede mekih tkiva
 - 1.2 Povrede glave
 - 1.3 Povrede vrata i ramena
 - 1.4 povreda kičme i kičmene moždine
 - 1.5 Povrede intraabdominalnih organa
 - 1.6 Povrede ekstremiteta
 - 1.7 Povrede genitalija
- 2.0 Literatura

1.0 Porođajne povrede

Porođajne povrede nastaju tokom procesa rađanja, a mogu se ili ne mogu, izbeci. Ne podrazumevaju povrede fetusa pri amniocentezi, intrauterinoj transfuziji. Predisponirajući faktori porođajne traume su makrosomija, prematuritet, kefalopelvična disproporcija, distocija, prolongiran porođaj, abnormalna prezentacija. Ove povrede mogu biti latentne ili u pocetku neznaatne, te da se razvijaju naglo i da brzo prolongiraju.

1. 1.1 POVREDE MEKIH TKIVA

Eritemi i erozije nastaju kod kefalopelvične disproporcije ili primenom vakum ekstraktora i forcepsa. Prolaze spontano nakon nekoliko dana, a rizik od sekundarne infekcije je minimalan.

Petehije su izazvane porastom intratorakalnog i venskog pritiska pri prolasku grudnog koša kroz porođajni kanal. Petehije u novorođenčeta sa pupčanicom omotanom oko vrata se nalaze samo iznad vrata. Prolaze za 2- 3 dana.

Ekhimoze se zapažaju kod traumatskog i karličnog porođaja, a ako su masivne, može se javiti anemija i hemoragični šok, te pojačati bilirubinemija. Spontano prolaze za jedan mesec.

Subkutana masna nekroza se karakteriše dobro ograničenim, tvrdim lezijama kože i vezivnog tkiva. Lezije se obično nalaze na mestima traume, a najčešće se uočavaju između 6. i 10. dana života (mogu čak i posle 6 nedelja). Promene su dijametra 1-10 cm, izdignute, koža iznad njih može biti kolorisana (crvena ili purpurna). Lečenje nije potrebno, razmekšavaju za 6 nedelja, prolaze za 6 meseci.

Laceracije nastaju akcidentalno, te u slučaju jačeg krvarenja treba napraviti suturu.

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. -----**

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com